

NÓTULAS FAUNÍSTICAS

ISSN-0327-0017

-2001-

Nº 1

NUEVOS REGISTROS DE AVES ESCASAS EN LA REGIÓN CENTRAL DE LA ARGENTINA

Ricardo TORRES (1) y Pablo MICHELUTTI (2)

Mediante la presente comunicación se amplía la distribución conocida de 21 especies de aves escasas o consideradas ausentes en el centro de la Argentina, concretamente en el sur de la provincia de Santiago del Estero y norte de la provincia de Córdoba.

Anhinga anhinga

Se observó una pareja el 5 de marzo de 1998 cerca de una colonia de nidificación formada mayormente por *Phalacrocorax olivaceus*, situada en las cercanías del puente sobre el río Utis (sobre la ruta provincial número 13, 29° 15' S, 63° 08' W), departamento Mitre, provincia de Santiago del Estero. La especie sólo era conocida para esta provincia como visitante invernal en los bañados de Figueroa (NORES *et al.*, 1991), que distan más de 200 km hacia el norte de la localidad señalada.

Tigrisoma lineatum

Se registró un individuo 2 km río arriba desde el puente sobre el río Utis, el 24 de abril de 1999, y otro en el mismo lugar el 28 de diciembre de 2000. La especie cuenta con escasas citas para la provincia de Santiago del Estero, un ejemplar en los bañados de Figueroa en julio de 1980 (NORES *et al.* 1991), e Icaño y cercanías (MENÉGAUX, 1925).

Phimosus infuscatus

En un recorrido de 200 km por los ríos Utis y Dulce (departamentos Mitre, Quebrachos y Rivadavia, provincia de Santiago del Estero) se censaron 69 individuos, solitarios, en parejas o en grupos de tres, en enero de 1999. Hasta el momento la especie había sido citada para esta provincia como escasa y de presencia únicamente invernal (NORES *et al.*, 1991).

¹ Cátedra de Diversidad Animal II, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Avenida Vélez Sársfield 299 (5000) Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

E-mail: rtorres44@hotmail.com

² Tucumán 296 (5143) Miramar, Provincia de Córdoba, República Argentina.

NÓTULAS FAUNÍSTICAS SEGUNDA SERIE	Nº 1	2001	1-5	BUENOS AIRES ARGENTINA
--------------------------------------	------	------	-----	---------------------------

Theristicus caudatus

Se registró un individuo posado en una arboleda en las cercanías del puente sobre el río Utis en diciembre de 1998. La coloración del ejemplar (vientre de color grisáceo y no negro, ausencia de collar gris y mancha gular doble) permitió diferenciarlo sin dudas de *T. melanopis*. En la provincia de Santiago del Estero, la especie anteriormente sólo contaba con un registro en las cercanías de la localidad de Icaño (MENÉGAUX, 1925).

Dendrocygna autumnalis

Dos individuos fueron vistos sobrevolando las cercanías del puente sobre el río Utis en marzo de 1997. La especie no contaba con avistajes en la provincia de Santiago del Estero desde 1952, cuando fueron observados 6 individuos en el bañado de Figueroa (OLROG, 1953), también en el mes de marzo.

Coscoroba coscoroba

En Santiago del Estero hasta el momento la especie ha sido citada como escasa y de presencia únicamente invernal (NORES *et al.*, 1991). En los bañados del río Dulce fueron registrados 3 individuos en Paso de la Cina (departamento Quebrachos, provincia de Santiago del Estero) en marzo de 1997; cerca de 1.000 individuos en la laguna Beltrán (29° 54' S, 62° 18' W, departamento Rivadavia, provincia de Santiago del Estero), y aproximadamente 1.500 ejemplares en Palo Negro (29° 37' S, 62° 11' W, departamento Rivadavia, provincia de Santiago del Estero), de los cuales cerca de un centenar eran pichones no voladores, en octubre de 1998; 3 individuos en las cercanías del puente sobre el río Utis y 38 ejemplares en el tramo del río Dulce desde Paso de la Cina hasta la laguna de los Porongos (30° 03' S, 62° 34' W, departamentos Quebrachos y Rivadavia, provincia de Santiago del Estero), en enero de 1999; 525 ejemplares en la laguna Beltrán y 30 individuos en Palo Negro en agosto de 1999. Durante un vuelo sobre las zonas sur y central de los bañados del río Dulce, realizado también en agosto de 1999, se registraron cerca de 2.100 individuos, concentrados sobre todo en la desembocadura del río Dulce y cercanías. Pudo constatarse la existencia de nidos en la zona noreste de los bañados. En un vuelo posterior, realizado en febrero de 2000, se censaron más de 1.500 ejemplares distribuidos en una amplia zona en el interior de dichos bañados. Por último se registraron 10 individuos en las cercanías del puente sobre el río Utis en julio de 2000 y 3 en enero de 2001. La abundancia observada se corresponde con su gran expansión numérica en la laguna Mar Chiquita desde hace poco más de una década (NORES, 1996). El hallazgo de nidos y pichones no voladores, junto a una cita a similar latitud en Brasil mencionada por SCOTT y CARBONELL (1986: 107), constituyen los registros de nidificación más septentrionales para la especie (BLAKE, 1977; NAVAS, 1977; CONTRERAS *et al.*, 1991).

Cygnus melancoryphus

Se observaron 10 individuos en la laguna Beltrán, en los bañados del río Dulce, en octubre de 1998; 17 ejemplares en un tramo de 30 km de recorrido por el río Dulce, desde la laguna de los Porongos hasta la laguna de los Toros (departamento Rivadavia, provincia de Santiago del Estero), en enero de 1999; y 3 individuos en la laguna Beltrán en agosto de 1999. Durante un vuelo sobre una amplia zona en los bañados del río Dulce se censaron 37 ejemplares en febrero de 2000. El último registro de esta especie en la provincia de Santiago del Estero correspondía a 10 individuos observados en los bañados del río Dulce en agosto de 1979 por R. MIATELLO (NORES *et al.*, 1991). Según lo observado, actualmente la especie sería permanente en dicha zona. Una pareja con cuatro pichones no voladores han sido observados y fotografiados en las cercanías de la laguna de los Porongos por J. FEIJOÓ en octubre de 1998.

Anas discors

Fue observado un individuo en la desembocadura del Suquía (departamento Río Primero, provincia de Córdoba), el 25 de febrero de 1994. Migratorio del hemisferio norte, en esta provincia había sido registrado sólo una vez cerca de Etruria, en mayo de 1989 (NORES, 1996).

Amazonetta brasiliensis

Fueron observados 5 individuos en las cercanías del puente sobre el río Utis, el 5 de marzo de 1998. Posteriormente, en un recorrido de aproximadamente 100 km por el río Dulce en la zona de los bañados, se registraron 19 individuos, solitarios, en parejas o en grupos de hasta 5 ejemplares. La especie ya había sido citada para los bañados del río Dulce por NORES *et al.* (1991), aunque estos autores la señalan como presente sólo durante el período invernal. Según lo observado, actualmente la especie parece ser permanente en la zona.

Sarkidiornis melanotos

Se observaron dos individuos en la localidad de Paso de la Cina, el 4 de marzo de 1997. La especie sólo cuenta con dos registros anteriores en la provincia de Santiago del Estero: bañados de Figueroa (OLROG, 1953) y La Palisa, cerca de Icaño (MENÉGAUX, 1925).

Cairina moschata

De esta especie se observó una hembra en Los Barriales (departamento Tulumba, provincia de Córdoba), el 27 de enero de 1992, y un macho en las cercanías de Miramar (departamento San Justo, provincia de Córdoba) en enero de 1997. NORES (1996) duda de su presencia en la provincia de Córdoba, dado que frecuentemente es criada como ave de corral, por lo que sería posible la aparición de ejemplares semisilvestres. No obstante, la coloración del plumaje de los ejemplares observados correspondía a la de la especie en estado silvestre.

Sarcoramphus papa

Se observó un ejemplar planeando junto a varios individuos de *Coragyps atratus*, el 1 de mayo de 2000, en las cercanías de Villa Candelaria (departamento Río Seco, provincia de Córdoba). Anteriormente esta especie fue observada sólo una vez en la provincia de Córdoba, en las sierras de Pocho, en marzo de 1986 (MIATELLO *et al.*, 1993).

Cathartes burrovianus

Fueron observados 3 individuos en un bajo salino con vegetación halófito, entre cardonales de *Cereus corine* y bosquecillos dispersos de tipo chaqueño, 15 km al noreste de Villa Candelaria, el 20 de noviembre de 1996. Posteriormente, el mismo día se registraron 2 individuos en un bosque de tipo chaqueño a 20 km al sur de Villa Candelaria, también en el departamento Río Seco (provincia de Córdoba). El 13 de enero de 2000 fueron observados 2 individuos en las cercanías de la localidad de Totoralejos, en las Salinas Grandes (departamento Tulumba, provincia de Córdoba). En las cercanías de Villa Candelaria se observó otro individuo el 27 de noviembre de 2000, en un bosque de tipo chaqueño. Esta especie contaba con un sólo registro en Córdoba, en la desembocadura del río Xanaes, en enero de 1991 (NORES, 1996).

Tringa solitaria

Se han observado 5 individuos en Paso de la Cina (marzo de 1997), y 25 ejemplares en un tramo de aproximadamente 100 km por el río Dulce, desde la ruta provincial número 13 hasta Paso de la Cina, en enero de 1999. Posteriormente, en enero de 2000 se observaron 3 individuos en Paso de Oscares, y 1 ejemplar en el mismo lugar en marzo de 2001. En la provincia de

Santiago del Estero la especie era citada hasta el momento para los bañados de Figueroa y Nueva Esperanza (NORES *et al.*, 1991).

Catoptrophorus semipalmatus

Se observó un individuo en la laguna de Pusseto, cerca de la desembocadura del arroyo Saladillo en la laguna Mar Chiquita (departamento San Justo, provincia de Córdoba) el 5 de agosto de 1991. Es migratorio del hemisferio norte, comúnmente hasta las costas del norte de Chile por el oeste y Río Grande do Sul por el este, en la Argentina es citado como raro en Tierra del Fuego (CLARK, 1986). Hasta el momento la especie no había sido registrada en Córdoba.

Calidris canutus

Fueron observados 3 individuos el 26 de abril de 1986 en Paso de la Cina, constituyendo esta la primera cita de la especie para la provincia de Santiago del Estero.

Larus pipixcan

Se observó un individuo en plumaje nupcial en agosto de 1999, en el terraplén sobre los bañados del río Dulce (departamento Rivadavia, provincia de Santiago del Estero). La especie no contaba con registros anteriores en esta provincia.

Rynchops niger

Fueron observados 22 ejemplares de la raza *cinerascens* en la laguna de los Porongos, en los bañados del río Dulce, el 2 de enero de 1999, formando parte de una bandada mixta junto a la subespecie *R. n. intercedens*, de la que se observaron 71 individuos. Es migratoria desde el norte de Sudamérica y la raza *R. n. cinerascens* no había sido registrada hasta el momento en la provincia de Santiago del Estero. Cabe destacar que la otra raza, *R. n. intercedens*, sólo había sido observada en dos ocasiones en esta provincia (NORES *et al.*, 1991).

Asio clamator

Se observó 1 individuo en un bosque de Vinal (*Prosopis ruscifolia*) en las cercanías del puente sobre el río Utis (departamento Mitre, provincia de Santiago del Estero). Hasta el momento la especie contaba con una sola cita para Santiago del Estero: un individuo capturado en Icaño en 1984 (NORES *et al.*, 1991).

Cinclodes comechingonus

Fue observada en una ocasión en zonas inundadas a los lados de la ruta provincial número 13, en los bañados del río Dulce (departamento Mitre, provincia de Santiago del Estero), en septiembre de 1999 (15 individuos). Junto a estos se observaron varios ejemplares de *C. fuscus*, lo que facilitó la correcta identificación de las especies por comparación. Hasta el momento la especie estaba citada en esta provincia sólo para los bañados de Figueroa (OLROG, 1972; NORES *et al.*, 1991).

Progne chalybea

Se registraron 18 individuos en las cercanías del puente sobre el río Utis, el 1 de enero de 1999. La especie anteriormente sólo contaba con dos citas en la provincia de Santiago del Estero, correspondientes a sendos ejemplares colectados en 1927, en las localidades de Girardet y de Campo del Cielo (NORES *et al.*, 1991), distantes al menos 200 km hacia el noreste de la presente observación.

AGRADECIMIENTOS

Las observaciones fueron realizadas durante trabajos de campo relacionados con proyectos subsidiados por CONICOR y SECyT-UNC. El Dr. J. G. HARO leyó en forma crítica el manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- BLAKE, E. R., 1977. Manual of neotropical birds. Vol. I. Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and Allies). Univ. of Chicago Press, Chicago and London. Pp. 1-674.
- CLARK, R., 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Ed. L.O.L.A. Buenos Aires, pp 1-294.
- CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. C. UTGES, 1991. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco, República Argentina. Ed. L.O.L.A. Buenos Aires, pp. 1-165.
- MENÉGAUX, A., 1925. Étude a'une collection d'oiseaux faite par M. E. Wagner dans le Chaco Argentin. *Revue Française d'Ornithologie*, 17: 221-238; 274-297; 322-329.
- MIATELLO, R., C. ROSACHER y V. COBOS, 1993. Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la Provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* (primera serie), 50: 1-5.
- NAVAS, J. R., 1977. Aves. Anseriformes. Fauna de agua dulce de la República Argentina. FECIC, Buenos Aires, pp. 1-94.
- NORES, M., 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Pp. 255-337, en: DI TADA, I. E. y E. BUCHER (eds.), Biodiversidad de la provincia de Córdoba. Vol. I. Fauna. Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR, 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba)*, 59: 158-196.
- OLROG, C. C., 1953. Sobre las aves del noroeste argentino. *El Hornero*, 10 (1): 84-85.
- OLROG, C. C., 1972. Notas ornitológicas VIII. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana*, 26 (18): 269-274.
- SCOTT, D. A. y M. CARBONELL (comp.). 1986. Inventario de humedales de la región neotropical. IWRB Slimbridge y UICN Cambridge. Pp. 1-714.